

Quand recevrai-je les résultats?

Si nous prélevons des échantillons de liquide, les résultats seront envoyés à votre médecin dans les 2 semaines. Prenez rendez-vous avec votre médecin pour faire le point sur les résultats.

Soins à domicile

Vous pourriez avoir la tête qui tourne si vous changez de position trop rapidement. Au début, bougez lentement.

Gardez le bandage sec pendant au moins 48 heures après le retrait du drain tubulaire. Retirez le bandage après 48 heures.

Au besoin, prenez un comprimé d'acétaminophène ordinaire (p.ex. du Tylenol) pour atténuer la douleur.

Quand dois-je obtenir de l'aide?

Appelez votre médecin si vous ressentez un des symptômes suivants :

- fièvre au-dessus de 38,5 °C (101 °F), douleurs musculaires et frissons;
- douleur ou rougeur au point de ponction ou aux alentours;
- fuite de liquide provenant du point de ponction;
- saignement provenant du point de ponction;
- douleur abdominale persistante.

HealthLinkBC

8-1-1

Appelez en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes. Le service HealthLinkBC est ouvert 24 heures sur 24.

Il est disponible en 130 langues. Pour avoir accès à un interprète, dites votre langue en anglais. Attendez qu'un interprète prenne votre appel.

Emplacements

Abbotsford-Regional Hospital Medical Imaging 2 nd Floor, Fraser Wing 32900 Marshall Road, Abbotsford	604-851-4866
BC Cancer Agency Medical Imaging, 3 rd Floor, 600 West 10 th Ave, Vancouver	604-877-6000
Burnaby Hospital Medical Imaging, 3rd Floor, 3935 Kincaid St., Burnaby	604-434-4211
Chilliwack General Hospital Medical Imaging, Main Floor, 45600 Menholm Road, Chilliwack	604-795-4122
Jim Pattison Outpatient Care and Surgery Centre Medical Imaging, 2 nd Floor, 9750 140 th Street, Surrey	604-533-3308 ext. 63926
Langley Memorial Hospital Medical Imaging, Main Floor, 22051 Fraser Highway, Langley	604-533-6405
Lions Gate Hospital Medical Imaging, Lower Level, 231 East 15 th Street, North Vancouver	604-984-5775
Peace Arch Hospital Medical Imaging, Main Floor, 15521 Russell Ave, White Rock	604-531-5512
Mount Saint Joseph Hospital Medical Imaging, Level 1, 3080 Prince Edward Str., Vancouver	604-877-8323
Richmond Hospital Medical Imaging, Main Floor 7000 Westminster Hwy, Richmond	604-278-9711
Ridge Meadows Hospital Medical Imaging, Main Floor, 11666 Laity Street, Maple Ridge	604-463-1800
Royal Columbian Hospital Medical Imaging, Columbia Tower 330 E. Columbia Street, New Westminster	604-520-4640
Sechelt Hospital Medical Imaging, 5544 Sunshine Coast Hwy, Sechelt	604-885-8608
St. Paul's Hospital Medical Imaging, 2 nd Floor, Providence Building 1081 Burrard Street, Vancouver	604-806-8006
Surrey Memorial Hospital Medical Imaging, 1 st Floor, Lower Level 13750 96 th Avenue, Surrey	604-588-3308
UBC Hospital Medical Imaging, Main Floor, 2211 Westbrook Mall, Vancouver	604-822-7076
Vancouver General Hospital GI/GU Department, Jim Pattison Pavilion Station 5, Ground Floor, 855 West 12 th Avenue, Vancouver www.fraserhealth.ca – www.vch.ca	604-875-4111 Ext 68612

Cette information ne remplace pas l'avis de votre prestataire de soins.


October 2015 FH Catalogue # 264805 French
VCH Catalogue # FA.140.A23.FR



Drainage abdominal

French

Abdominal Drainage



Recommandations de suivi/Rendez-vous :

Qu'est-ce que le drainage abdominal?

Le drainage abdominal est une intervention visant à évacuer un liquide collecté dans l'abdomen (accumulation connue sous le nom d'ascite). Le drainage abdominal est également employé pour retirer le liquide accumulé dans un abcès de l'abdomen.

Pourquoi avoir recours à cette intervention?

Cette intervention a pour objectif de :

- soulager l'inconfort;
- soulager la pression ascendante sur le diaphragme, facilitant la respiration;
- soulager la pression sur la vessie (certaines personnes auront besoin d'uriner plus souvent par la suite).

Il est également possible qu'on prélève quelques échantillons de liquide à des fins d'analyse.

Qui effectue cette intervention?

Elle est effectuée par un radiologue (un médecin qui se spécialise en interventions guidées par imagerie). Une échographie, une radioscopie ou un tomodensitogramme servent de guide pour trouver l'endroit où le liquide amassé doit être collecté.

Puis-je être accompagné d'un membre de ma famille ou d'un ami?

Oui, ils peuvent rester avec vous avant et après l'intervention. Toutefois, pour des raisons de sécurité et en accord avec les règlements, ils ne peuvent pas être présents dans la salle pendant l'intervention. Nous les aviserons de l'endroit où ils peuvent vous attendre.

Que se passe-t-il avant l'intervention?

Le Service d'imagerie médicale vous contactera pour vous donner des instructions spécifiques sur la manière dont vous devez vous préparer pour l'intervention.

Nous vous recommandons de demander à un adulte responsable de vous raccompagner à la maison après l'intervention.

Vérifiez avec l'endroit où votre drainage abdominal est programmé.

Avant l'intervention, une infirmière pourrait examiner vos antécédents médicaux et vérifier votre pression artérielle et votre fréquence cardiaque.

Combien de temps faudra-t-il?

L'intervention durera de 30 minutes à 1 heure.

Que se passe-t-il pendant l'intervention?

Une fois allongé, nous nettoierons votre abdomen avec une solution antiseptique.

Le radiologue injecte un médicament anesthésiant pour « insensibiliser » la peau.

À l'aide d'une échographie ou d'un tomodensitogramme, une aiguille est insérée dans l'abdomen et guidée vers la zone affectée.

Un petit drain tubulaire (appelé cathéter) et ensuite introduit puis guidé dans l'abdomen. Une fois mis en place, celui-ci est relié à une poche de drainage. Des échantillons de liquide pourraient être prélevés à ce moment-là.

Le drain est retiré une fois l'écoulement du liquide terminé. Nous recouvrons le point de ponction avec un bandage.

Est-ce que c'est douloureux?

Vous pourriez ressentir des sensations de picotement ou de brûlure au moment de l'injection du médicament anesthésiant. Vous ne devriez ressentir aucune douleur lors de l'introduction de l'aiguille et du cathéter.

Alors que le liquide sera évacué, vous devriez vous sentir plus confortable. Votre abdomen deviendra plus petit, parfois bien plus petit.

Que se passe-t-il ensuite?

Il vous faudra peut-être rester à l'hôpital pendant quelques heures suite à l'intervention car nous devons nous assurer que vous êtes en état de partir. Pour la plupart des gens, il est possible de rentrer à la maison le même jour.

Existe-t-il des risques ou des complications possibles?

À chaque fois que la peau est percée ou coupée, il existe la possibilité d'infection ou de saignement.

Les autres complications possibles sont :

- une ponction à un organe abdominal;
- une baisse de votre pression artérielle.

Vous pouvez poser des questions concernant les risques avant de signer le formulaire de consentement.