

## 可預期會怎麼樣，續

醫生將會用手指檢查您的直腸，之後會非常徐緩地把乙狀結腸鏡放進您的肛門。醫生可能會放一些空氣入乙狀結腸鏡，以便能看得更清楚。這可能令您絞痛或感到肚脹。醫生可將儀器穿過內窺鏡，進行活檢或切除息肉。

## 做了軟式乙狀結腸鏡檢查之後

由於我們在這項醫療程序期間放了一些空氣通過乙狀結腸鏡，您可能感到絞痛或肚脹。如果我們沒有給您施用鎮靜劑，在檢查後您可正常進食及如常生活。在檢查後有幾天有少許出血是正常的。如有大量出血、發燒或發冷，要去最就近的急症室。

## 結果

您做了乙狀結腸鏡檢查之後，醫生在您回家前將會與您談及檢查結果。如果我們抽取了組織樣本，我們將會在大約兩星期內進行分析。如果樣本不正常，您的專科醫生將會打電話給您，商談檢查結果及進行預約(如有必要)。

## 問題

如有什麼問題，請與您的家庭醫生或專科醫生商談。

Chinese Traditional

What is Flexible Sigmoidoscopy?

何謂  
軟式乙狀結腸鏡檢查？

這份材料經過病人、家屬和職員審核及認可。



欲多取幾份，可上網到 <http://phc.eduhealth.ca>，  
或電郵至 [pheh@providencehealth.bc.ca](mailto:pheh@providencehealth.bc.ca)，  
講出目錄編號 **FK.140.F6393.CN.PHC**

©Providence Health Care  
[www.providencehealth.bc.ca](http://www.providencehealth.bc.ca)

本文件內的資料只限  
得到醫療小組提供這些資料的人士使用。

FK.140.F6393.CN.PHC (Sep-15)

## 定義

軟式乙狀結腸鏡檢查是一種可讓醫生仔細觀察直腸和部分大腸(結腸)的內膜的方法。這項醫療程序是由腸胃科醫生負責，這位醫生接受過有關胃和腸道的專科教育。

醫生會使用一種稱為軟式乙狀結腸鏡的儀器。這是一條柔韌的管子，末端附有光源。醫生可將儀器穿過這條管子，抽取組織樣本(活檢)或切除息肉。

## 我們為何進行軟式乙狀結腸鏡檢查


這項醫療程序有助醫生診斷直腸和結腸裏的問題。

## 風險

與任何醫療程序一樣，接受軟式乙狀結腸鏡檢查是有風險的。然而，併發症是很罕見的。在 10,000 個接受軟式乙狀結腸鏡檢查的人當中，大約有一個會有併發症。可能出現的併發症包括：

- 感染。
- 結腸壁或直腸壁出現穿孔或裂口。
- 在我們進行活檢或切除息肉之處出血。

在您簽署做這項醫療程序的同意書之前，醫生會向您更詳細講解風險問題。



## 您怎樣為軟式乙狀結腸鏡檢查做好準備

在做這項醫療程序之前大約一小時，您通常需要做一次快速灌腸。有些人需要使用通便劑及限制進食。在進行這項醫療程序之前見面時，專科醫生會給您詳細資料。

您可繼續服用大部分藥物。如果您正服用薄血藥，要告訴您的家庭醫生和專科醫生。

這方面的藥包括可邁丁 (Coumadin) (華法令)、肝素、波立維 (Plavix) (氯吡格雷)及阿士匹靈 (ASA，亦即乙醯水楊酸)。如果您對一些藥物有過敏反應，也務必要告訴您的專科醫生。

## 可預期會怎麼樣

軟式乙狀結腸鏡檢查需時大約 15 分鐘。它可安全舒適地進行，毋須使用鎮靜劑來令您鬆馳。我們將會請您把腰部以下的衣物拉下。如果您選擇使用鎮靜劑，我們將會在您的手臂或手部開始進行靜脈滴注 (IV)。我們將會請您向左側臥，雙膝屈起至胸部。