

Radial Assess - Cardiac Angiogram Discharge Instructions

橈動脈-冠狀動脈造影手術

Chinese (Traditional)

日常生活

- 回家休息直至翌日早上。
- 保持做檢查的手腕伸盡量伸直六個小時。
- 兩日內不要用有繃帶的手去提舉，做體育活動，或使力的工作。

駕車，性生活，工作：

- 向為你進行手術的醫生查詢，甚麼時候才可重返工作。

繃帶

- 在手術後的晚上保持繃帶乾燥，直至翌日早上。
- 隔日早晨方可去除繃帶。
- 不需自行更換繃帶。
- 七日內可以淋浴，但不可以浸浴。

如果傷口出血：

傷口流血跡象如下：繃帶有血，手腕打針部位出現腫脹，刺痛，疼痛。

若手術部位腫脹或傷口出血，你必須：

- 除去繃帶。
- 檢查測驗小孔之下或附近是否出血或腫脹。
- 以手拇指用力按在傷口處十五分鐘，若有需要可請旁人代按。
- 用力按壓至你的手指下感到心跳。
- 保持按壓傷口最少十五分鐘。

若傷口持續出血，或腫脹範圍變大，或變硬，就要繼續用手按在傷口處，致電911求助。

若有以下情況，請立即入院檢查：

- 手腕部位麻痺、刺痛、乏力、腫脹、疼痛、過冷、過熱，或發白。
- 手腕部位傷口處發紅、過熱、流出液體或流膿。
- 發燒或發冷。

For more copies, go online: <http://vch.eduhealth.ca> or <http://phc.eduhealth.ca>
or email: pem@vch.ca or pem@providencehealth.bc.ca
and quote catalogue no. **EC.300.C1791.CN**

© Vancouver Coastal Health & Providence Health Care
www.vch.ca www.providencehealth.bc.ca

The information in this document is intended solely for the person to whom it was given by the health care team.