

Radial Access - Cardiac Angiogram Discharge Instructions 桡动脉入路-冠状动脉造影手术后注意事项 Chinese (Simplified)

如有出血情况:

日常生活

- 回家休息（卧床或躺椅）至翌日。
- 保持做检查的手腕尽量至少六个小时。
- 两日不要用绑有绷带的手臂做做任何提举、体育活动或重体力工作。

驾车，性生活，返回工作岗位:

- 向为您做检查的医生询问，何时您能返回工作岗位。

绷带

- 在检查后的当天晚上和夜间，保持绷带干燥。
- 隔日早晨方可去除绷带。
- 勿绑上另一条绷带。
- 检查之后的第二天早上你可能可以洗浴或淋浴。

伤口流血迹象如下: 针头穿刺手腕部位的绷带上有血、肿胀、刺痛、疼痛。

若手术部位肿胀或伤口出血,你必须:

- 除去绷带。
- 检查小测试孔下面或附近是否出血或肿胀。
- 用手指用力按在针口处上至十五分钟，若有需要可请旁人代按。
- 用力按至拇指感觉到心脏的跳动。
- 保持按压伤口最少十五分钟。

若伤口持续出血，或肿胀范围变得更大或更硬，致电911求救。

若有以下情况, 请前往最就近的医院院检查:

- 麻木/刺痛/乏力/肿胀/过冷/发热/白色物质。
- 穿刺部位发红、发烫、渗出或有脓。
- 突然就发烧或发冷。

For more copies, go online: <http://vch.eduhealth.ca> or <http://phc.eduhealth.ca>
or email: pem@vch.ca or pem@providencehealth.bc.ca
and quote catalogue no. **EC.300.C1791.CS**
© Vancouver Coastal Health & Providence Health Care
www.vch.ca www.providencehealth.bc.ca

The information in this document is intended solely for the person to whom it was given by the health care team.