

鎮靜劑對每個人的影響各有不同

Sedation effects differ from person to person

	<p>沒有使用鎮靜劑</p> <p>有警覺性／清醒 完全知道周邊環境的情況</p>
	<p>少量鎮靜劑</p> <p>有睡意／容易醒來 警覺性接近基線水平 對口頭指令反應正常 神智功能可能受影響／減弱 身體協調功能可能受影響／減弱</p>
	<p>中等份量鎮靜劑</p> <p>眼簾下垂及說話不清 對口頭指令或光線刺激能作出刻意反應 病人出院時可能仍受鎮靜劑的影響，會間歇性睡倒 剛完成醫療程序期間，往往出現健忘情況</p>




您將不獲准自己開車回家。若沒有一名成年人陪同出院，並負責開車送您回家或帶您回家，您將不能離開診所或該醫療設施。

接受了鎮靜劑後

使用了鎮靜劑後，即使您感覺良好，但其實仍未完全恢復過來。

神智功能及／或身體協調功能可能受影響／減弱。
藥力的影響可在程序完成後多至 24 小時仍然存在。

您可能會出現以下情況：





Making better
decisions together
with patients
and families

For more copies, go online at vch.eduhealth.ca or
email pchem@vch.ca and quote Catalogue No. **ED.900.E53.CN**
© Vancouver Coastal Health, January 2022

本文件的資訊只供醫護團隊派發給的指定人士使用。
The information in this document is intended solely for the
person to whom it was given by the health care team.

vch.ca