



Making better
decisions together
with patients
and families

For more copies, go online at vch.eduhealth.ca or
email pchem@vch.ca and quote Catalogue No. **ED.900.E53.FA**
© Vancouver Coastal Health, January 2022

اطلاعات این نوشتار صرفاً برای شخصی است که آن را از تیم مراقبت بهداشتی خود دریافت کرده است.

The information in this document is intended solely for the
person to whom it was given by the health care team.

vch.ca



پس از دریافت آرامبخش

حتی اگر پس از دریافت آرامبخش احساس خوب بودن داشته باشید، اثر داروهای آرامبخش به طور کامل از بین نرفته است.

احتمال مختل شدن/کاهش عملکرد ذهنی و/یا سطح هماهنگی فیزیکی.

اثرات ممکن است تا 24 ساعت پس از عمل باقی بماند.

ممکن است موارد زیر را تجربه کنید



اثرات دریافت آرامبخش به یک فرد با فرد دیگر تفاوت دارد

Sedation effects differ from person to person

<p>بدون آرامبخش</p> <p>هشدار/بیدار کاملاً آگاه نسبت به محیط اطراف خود</p>	
<p>دریافت جزئی آرامبخش</p> <p>خواب آلود/بیدار شدن به راحتی انجام می‌شود سطح هوشیاری نزدیک به خط مبنا پاسخگویی عادی به دستورات کلامی احتمال مختل شدن/کاهش عملکرد ذهنی احتمال مختل شدن/کاهش سطح هماهنگی فیزیکی</p>	
<p>آرامبخشی متوسط</p> <p>افتادگی پلک و گفتار نامفهوم پاسخگویی هدفمند به دستورات کلامی یا تحریک نوری بیماران ترخیصی ممکن است اثرات دریافت آرامبخش را نشان دهند و به طور متناوب به خواب بروند اغلب همراه با فراموشی در حوالی دوره عمل</p>	

شما اجازه رانندگی به منزل را نخواهید داشت و اگر بزرگسال مسئولی موجود نباشد که بتواند رانندگی کرده و شما را به منزل برساند یا ببرد، نمی‌توانید کلینیک یا مرکز را ترک کنید